

MULTIDISCIPLINE PROCEEDINGS OF
**DIGITAL FASHION
CONFERENCE**

KOREA, REPUBLIC OF

Multidiscipline Proceedings of

DIGITAL FASHION CONFERENCE

May 2024 (*Volume 4, No.3*)

Copyright © 2024
By Woongjin Think Big Co., Ltd.
All rights reserved.
Available at digitalfashionsociety.org
Published:
서울 합정역
파주출판도시
ISSN 2466-0744
Seoul
Rebuplic of Korea (ROK),

EDITORIAL BOARD

Katharina Sand

*PhD Candidate - Faculty of Communication, Culture and Society, USI -
Università della Svizzera italiana*

Alice Noris

*PhD Candidate - Faculty of Communication, Culture and Society, USI -
Università della Svizzera italiana*

Michela Ornati

*Faculty of Communication, Culture and Society, USI - Università della
Svizzera italiana*

ELSEVIER



SRN
Societal Research Network

Universal
Impact Factor



**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ
ТЕЛА У МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Г.ТАШКЕНТА.**

Гилязетдинов К.Н.,

Республиканский Специализированный научно-практический медицинский
Центр Эндокринологии МЗ РУз им. Академика Я.Х. Туракулова

Рахимова Г.Н.,

Центр Развития Профессиональной
Квалификации Медицинских Работников.

г. Ташкент, Узбекистан

Сиддилов А.А1.

Республиканский Специализированный научно-практический медицинский
Центр Эндокринологии МЗ РУз им. Академика Я.Х. Туракулова

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Эпидемия ожирения среди детей и подростков распространяется по всему миру. По данным ВОЗ на планете около 22 млн. детей младше 5 лет и 155 млн детей школьного возраста имеют избыточную массу тела. Известно, что у трети взрослых ожирение начинается в детском или подростковом возрасте и сопровождается при этом более выраженной прибавкой массы тела и увеличением частоты развития сопутствующих заболеваний во взрослом возрасте. Ожирение в детстве-это высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний(ССЗ) во взрослой жизни. Около 60% детей с ожирением уже к 10 годам имеют один из факторов развития ССЗ. Ожирение в юношеском возрасте в 70% случаев сочетается с артериальной гипертонией, в 25%-с нарушенной толерантностью к глюкозе. Учитывая вышеприведенные факты необходимо изучить распространенность данной патологии среди детей и подростков г.Ташкента, т.к. достоверная оценка уровня распространенности ожирения и избыточной массы тела необходима для правильной организации лечебно-профилактической помощи.

Цель исследования. Оценить распространенность ожирения и избыточной массы тела у мальчиков и юношей узбекской популяции г. Ташкента.

Методы исследования. Было обследовано всего 818 мальчиков и юношей с 7 до 18 лет г. Ташкента методом скрининга. Обследование проводилось среди средних школ, колледжей и лицеев Мирзо-Улугбекского, Шахантахурского и Юнус-Абадского районов г. Ташкента. Оценка ИМТ проводилась с помощью перцентильных таблиц (ВОЗ 2007 г.). При этом ИМТ выше 97 перцентили расценивался как ожирение, ИМТ от 85 до 97 перцентили как избыточная масса тела.

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что ожирение у мальчиков и юношей узбекской популяции г. Ташкента наблюдалось у 16 человек (1,9%). Избыточная масса тела была выявлена у 32 (3,9%)

Выводы. Впервые была получена распространенность ожирения и избыточной массы тела у мальчиков и юношей узбекской популяции г.Ташкента, которая составила 1,9% и 3,9% соответственно.